

PEDİATRİ KAÇIŞ ODASI CEVAP ANAHTARI

1

Tam Ekran



Tıklayınız.

2

Tam Ekran



Normal spontan vaginal yolla, 3500 gr olarak doğmuş. Aşıları ulusal
bağışıklama programına göre eksiksiz yapılmış. Kreşe gidiyor.

Bilgiyi inceleyiniz.

3

Tam Ekran



Tıklayınız.

4

Tam Ekran



Resmi inceleyiniz.

5

Tam Ekran



Tıklayınız.


6

Tam Ekran




Her iki klasöre tıklayınız ve bilgileri inceleyiniz.

7



Bilgiyi inceleyiniz.

8



Bilgileri inceleyiniz.

9

Tam Ekran



Tıklayınız.

10

Tam Ekran



Çantaya tıklayınız.

11



Tam Ekran

Bilgileri inceleyiniz.

12



Tam Ekran

Tıklayınız.

13

Tam Ekran

Beş(5) yaşında erkek hasta, üç(3) saat önce kusmaya başlamış (2 kez yediklerini çıkarmış) anne daha sonra ateşi olduğunu farketmiş. Son bir(1) saattir halsizliği belirginleşen hastanın karnında, sırtında kırmızı renkli döküntülerinin farkedilmesi üzerine polikliniğe getirildi. Anne iki (2) saat önce V1:38.9°C ölçmesi üzerine hastaya parasetamol (oral) vermiş. Öksürük, burun akıntısı, hapşırık yakınması yok. İdrar yaparken yanması, sık idrara gitmesi yok. İshali yok. Çevrede benzer hastalığı olan kimse yok. Yakın zamanda aşılama öyküsü yok.

Bilgileri inceleyiniz.

14

Tam Ekran



Tıklayınız.

Metinde tanımlanan çocukluk çağı döküntülü hastalığını karşısındaki kutucuğa kaydet, daha sonra yuvarlak içindeki harfleri anahtar kelimeyi bulmak için kullan.


Yatay

- 1 Prodrom dönemi belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, ateş ve koplik lekeleri yer alan, döküntü ilk olarak ense saçlı deri sınırından ve kulak arkasından başladığı ve aşağıya doğru yayılır ve 3. gün ayaklara ulaştığı çocukluk çağı döküntü hastalığı (7) ① / ②

- 2 Tipik olarak döküntüden önce "subokspital, postauriküler lenfadenopati" görüldüğü, döküntünün yüz ve göğüsten başlayıp 24 saatte tüm vücuda yayıldığı çocukluk çağı döküntü hastalığıdır. (10) ① / ②

- 3 Döküntünün en uzun süre devam ettiği ve "tokat atılmış yüz" görüntüsüne neden olan hastalığın etkenidir (13) ① / ②

- 4 Tipik olarak < 3 yaş çocukları etkileyen 3-5 gün süren yüksek ateşi takiben ateşin düşmesiyle



Bulmacayı doldurunuz.

Metinde tanımlanan çocukluk çağı döküntülü hastalığını karşısındaki kutucuğa kaydet, daha sonra yuvarlak içindeki harfleri anahtar kelimeyi bulmak için kullan.

Yatay

- 1 Prodrom dönemi belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, ateş ve koplik lekeleri yer alan, döküntü ilk olarak ense saçlı deri sınırından ve kulak arkasından başladığı ve aşağıya doğru yayılır ve 3. gün ayaklara ulaştığı çocukluk çağı döküntü hastalığı (7) ① / ②

MEASLES


- 2 Tipik olarak döküntüden önce "subokspital, postauriküler lenfadenopati" görüldüğü, döküntünün yüz ve göğüsten başlayıp 24 saatte tüm vücuda yayıldığı çocukluk çağı döküntü hastalığıdır. (10) ① / ②

KIZAMIKÇIK

- 3 Döküntünün en uzun süre devam ettiği ve "tokat atılmış yüz" görüntüsüne neden olan hastalığın etkenidir (13) ① / ②

PARVİRÜSB19

- 4 Tipik olarak < 3 yaş çocukları etkileyen 3-5 gün süren yüksek ateşi takiben ateşin düşmesiyle



çocukları arasında yaygın görülen yağ-
döküntü hastalığıdır. (10) /

KIZAMIKÇIK

- 3 Döküntünün en uzun süre devam ettiği ve
"tokat atılmış yüz" görüntüsüne neden olan
hastalığın etkenidir. (13) /

PARVOVİRÜSB19

- 4 Tipik olarak < 3 yaş çocukları etkileyen 3-5 gün
süren yüksek ateşi takiben ateşin düşmesiyle
birlikte gövdeden başlayan ense, yüz ve kol-
bacaklara yayılan döküntü ile karakterize
çocukluk çağı döküntü hastalığıdır. (Cevaplar
arada bir karakter boşluk olan iki kelimeden
oluşmaktadır.) (16) /

EGZANTEM _ SUBITUM

- 5 Gövdeden başlayıp yüz, kol ve bacaklara
yayılan farklı evrelerde (makül, papül, vezikül)
kaşıntılı döküntüler ile karakterize çocukluk
çağı döküntülü hastalığıdır. (10) /

CHICKENPOX

E	G	Z	A	N	I	E	M	S	U	B	I	I	U	M
C	H	I	C	K	E	N	P	O	X					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P	A	R	A	C	E	L	S	U	S

Kontrol Et


Yeniden Dene

"Kontrol et" butonuna tıklamayı unutmayınız.



Bütün meyvelerin böğürtlenlerle
aynı anda olgunlaştığını sanan
kişi, üzümleri hiç tanımıyor
demektir...

19



Birinci odadaki görevleri tamamladınız. “Çık” butonuna tıklayınız.

20



Şifre sözcüğü bulmalısınız.

Tıklayınız.

21

Tam Ekran

4 L K 6 P 3
 O 7 3 i 1 K
 M 9 8 F 5 R

764
50392

REF
FPBLZ

WEM
MEW3

CDS
CUDN

3 4 1 7 6 3

Şifre kısmına gelmesi gereken rakamları harfleri referans alarak bulunuz.

22

Tam Ekran



Tıklayınız.

23

Tam Ekran

Lütfen kasadaki bardağı uygun yere sürükleyip bırakın



Kontrol Et

Kasadaki bardağı maus yardımıyla tutup çocuğun üzerine götürünüz.

24

Tam Ekran

Lütfen kasadaki bardağı uygun yere sürükleyip bırakın



Kontrol Et

Bardak çocuk görselinin üzerine gelmelidir.

25

Tam Ekran



Meningokoksemi'de döküntü ateşin başlamasından sonraki ilk 24 saat içinde ortaya çıkar. Döküntünün ortaya çıkması tanı konulmasını kolaylaştırır. Her ne kadar tipik döküntü "basmakla solmayan" petesiyal-purpurik döküntü olsa da hastaların %10-15'inde erken dönemde basmakla solan makülopapüler döküntü görülebilir. Bu makülopapüler döküntü saatler içinde ilerleyerek klasik "basmakla solmayan" petesiyal-purpurik döküntüye ilerler. İlk başvuru anında hastaların %80'inde döküntü vardır.

Bilgileri inceleyiniz.

26

evlet COMU UBYS COMU COMU - Tıp

YouTube Google Akademik R[®] ResearchGate LinkedIn Tem

ODA 1 BULMACA 1

ODA 1 BULMACA

Düzenle

Siteden çıkılsın mı?

Yaptığınız değişiklikler kaydedilmemiş olabilir.

Çık

İptal

1 BULMACA 4

ODA 1 BULMACA 5

09:04

Birinci odadaki görevleri tamamladınız. “Çık” butonuna tıklayınız.

27


Tam Ekran




Tıklayınız

28

Tam Ekran



Bulmacayı çözünüz.



Bulmacayı çözümünü inceleyin.



Açılan dolaba tekrar tıklayınız.

31

Tam Ekran



Lütfen doğru ilacı çocuğun üzerine sürükleyip bırakın



Kontrol Et

Uygun olan ilacı çocuğun resminin üzerine sürükleyin.

32

Siteden çıkılsın mı?

Yaptığınız değişiklikler kaydedilmemiş olabilir.

Çık

İptal

10:01

Bulmacayı çözünüz.

33


Tam Ekran



Annenin elindeki kağıda tıklayın.

34

Tam Ekran



Kodu inceleyin.

35

Tam Ekran



Telefon görseline tıklayınız.

36

Tam Ekran



6336644466466655666557777336444333

666677782555444833

9998855777733558444777

BİRİNCİ KELİMEYİ GİRİN

İKİNCİ KELİMEYİ GİRİN

ÜÇÜNCÜ KELİMEYİ GİRİN

Gönder

Numaraların tuşlar üzerindeki kodlamasına göre şifre sözcükleri bulunuz.

37

Tam Ekran



6336644466466655666557777336444333

666677782555444833

9998855777733558444777

MENİNGOKOKSEMİDE

MORTALİTE

YÜKSEKTİR

Gönder

Şifre sözcükleri ilgili yere yazınız.

38

Tam Ekran

Kızamık tanısı alan çocuklar döküntünün çıkmasından sonraki boyunca izole edilmeli ve kızamığa bağışık olmayan (2 doz aşısı olmayan veya hastalığı geçirmemiş) temaslılara kontrendikasyon (<6 ay çocuk, immün yetmezlik) yoksa saat içinde

kızamık aşısı uygulanmalıdır.


☐ 14 gün – 96 saat

☐ 4 gün – 96 saat

☐ 4 gün – 72 saat

☐ 14 gün - 72 saat

☒ Kontrol Et


Toplam 4 soru üzerinden 1 sorudasınız

Doğru yanıtları bulun.

Kızamık tanısı alan çocuklar döküntünün çıkmasından sonraki boyunca izole edilmeli ve kızamığa bağışık olmayan (2 doz aşısı olmayan veya hastalığı geçirmemiş) temaslılara kontrendikasyon (<6 ay çocuk, immün yetmezlik) yoksa saat içinde kızamık aşısı uygulanmalıdır.   

☐ 14 gün – 96 saat

☐ 4 gün – 96 saat

☒ 4 gün – 72 saat

☐ 14 gün - 72 saat

 Kontrol Et



Toplam 4 soru üzerinden 1 sorudasınız

Doğru yanıtları bulun.

Kızamık tanısı alan çocuklar döküntünün çıkmasından sonraki boyunca izole edilmeli ve kızamığa bağışık olmayan (2 doz aşısı olmayan veya hastalığı geçirmemiş) temaslılara kontrendikasyon (<6 ay çocuk, immün yetmezlik) yoksa saat içinde kızamık aşısı uygulanmalıdır.   

14 gün – 96 saat

4 gün – 96 saat

 4 gün – 72 saat

14 gün - 72 saat

Doğru!

 1/1



Toplam 4 soru üzerinden 1 sorudasınız

Doğru yanıtları bulun.

Kızamıkçık tanısı alan çocuklar döküntü başlangıcından sonraki boyunca izolasyonda kalmalıdır.   

✓ 7 gün

21 gün

4 gün

14 gün

★ 1/1



Toplam 4 soru üzerinden 2 sorudasınız

Doğru yanıtları bulun.

Suçiçeği tanısı alan çocuklar izolasyonda kalmalıdır. Temas sonrası duyarlı kişilerin %70-90'ında enfeksiyonu önler ve suçiçeği geliştirenlerde hastalığın şiddetini azaltır, bu nedenle kontrendikasyon (immün yetersizlik, <12 ay çocuk) yoksa

temastan sonraki..... içinde aşı uygulanmalıdır.   

5 gün – 6 gün

7 gün – 10 gün

✓ Döküntüler kurutlanıncaya kadar – 5 gün

Döküntüler kurutlanıncaya kadar – 10 gün

★ 1/1



Toplam 4 soru üzerinden 3 sorudasınız

Doğru yanıtları bulun.

Meningokok enfeksiyonu şüphesi olan hastalar etkili tedavi alana kadar izolasyonda kalmalıdır. Hasta bireyin oral salgıları ile direkt temas eden veya hasta birey ile yakın teması olan (özellikle <2 yaş), hastalık ortaya çıkışından öncesine kadar hasta ile aynı odada uyuyan, aynı yemek gereçleri kullanan bireylere kemoproflaksi uygulanmalıdır. (i) (i) (i)

48 saat – 10 gün

72 saat – 3 gün

96 saat – 14 gün

✓ 24 saat – 7 gün

★ 1/1



✓ Bitti

Toplam 4 soru üzerinden 4 sorudasınız

Doğru yanıtları bulun.

Siteden çıkılsın mı?

Yaptığınız değişiklikler kaydedilmemiş olabilir.

Çık

İptal

14:44

45

Tam Ekran



Tıklayınız

46

Tam Ekran



Resme tıklayınız.

Tam Ekran

Düşey

1	2	3	4
---	---	---	---

 Yeniden Dene

Tam Ekran

1	R	I	F	A	M	P	I	S	I	N									
2	S	E	F	T	R	I	A	K	S	O	N								
3	C	I	P	R	O	F	L	O	K	S	A	S	I	N					
4	A	Z	I	T	R	O	M	I	S	I	N								

Düşey

1	2	3	4
P	A	R	S

 Yeniden Dene

49

Tam Ekran




Tıklayınız

50

Tam Ekran

Lütfen aile üyelerini doğru ilacın üzerine sürükleyip bırakın



AZİTROMİSİN

Hangi ilacın bu kaçış odasındaki bilgilere göre kimlere verilebileceğini (baba, abla, kardeş, anne) belirleyiniz. Belirlediğiniz kişileri ilacın üzerine maus yardımı ile sürükleyip bırakınız.

51

Tam Ekran

ABLA (7 Yaş)

AZİTROMİSİN

BABA (35 Yaş)

KARDEŞ (2 Yaş)

ANNE (33 Yaş)

Kontrol Et



Hangi ilacın bu kaçış odasındaki bilgilere göre kimlere verilebileceğini (baba, abla, kardeş, anne) belirleyiniz. Belirlediğiniz kişileri ilacın üzerine maus yardımı ile sürükleyip bırakınız.

52

Tam Ekran

CİPROFLOKSASİN

BABA (35 Yaş)

ABLA (7 Yaş)

KARDEŞ (2 Yaş)

ANNE (33 Yaş)

Hangi ilacın bu kaçış odasındaki bilgilere göre kimlere verilebileceğini (baba, abla, kardeş, anne) belirleyiniz. Belirlediğiniz kişileri ilacın üzerine maus yardımı ile sürükleyip bırakınız.

53

Tam Ekran



Hangi ilacın bu kaçış odasındaki bilgilere göre kimlere verilebileceğini (baba, abla, kardeş, anne) belirleyiniz. Belirlediğiniz kişileri ilacın üzerine maus yardımı ile sürükleyip bırakınız.

54

Tam Ekran



Hangi ilacın bu kaçış odasındaki bilgilere göre kimlere verilebileceğini (baba, abla, kardeş, anne) belirleyiniz. Belirlediğiniz kişileri ilacın üzerine maus yardımı ile sürükleyip bırakınız.

55

Tam Ekran



BABA (35 Yaş)

KARDEŞ (2 Yaş)

RİFAMPİSİN

ABLA (7 Yaş)

ANNE (33 Yaş)

✓ Kontrol Et



56

Tam Ekran



SEFTRİAKSON

BABA (35 Yaş)

ABLA (7 Yaş)

KARDEŞ (2 Yaş)

ANNE (33 Yaş)

✓ Kontrol Et




Hangi ilacın bu kaçış odasındaki bilgilere göre kimlere verilebileceğini (baba, abla, kardeş, anne) belirleyiniz. Belirlediğiniz kişileri ilacın üzerine maus yardımı ile sürükleyip bırakınız.

Hangi ilacın bu kaçış odasındaki bilgilere göre kimlere verilebileceğini (baba, abla, kardeş, anne) belirleyiniz. Belirlediğiniz kişileri ilacın üzerine maus yardımı ile sürükleyip bırakınız.

57

Tam Ekran



SEFTRİAKSON

ABLA (7 Yaş)

Kontrol Et



Hangi ilacın bu kaçış odasındaki bilgilere göre kimlere verilebileceğini (baba, abla, kardeş, anne) belirleyiniz. Belirlediğiniz kişileri ilacın üzerine maus yardımı ile sürükleyip bırakınız.

58

Siteden çıkılsın mı?

Yaptığınız değişiklikler kaydedilmemiş olabilir.

Çık

İptal

14:44